

Głowienka (kaczka rdzawogłowa) (*Aythya ferina*)



I. Występowanie i siedlisko

Teren, który zamieszkuje głowienka rozciąga się szerokim pasem od Islandii poprzez Europę zachodnią aż do północno-wschodnich Chin i północnej Japonii. Główne jej zimowiska znajdują się w Europie zachodniej i basenie Morza Śródziemnego. W Polsce jest gatunkiem średnio licznym bytującym na niżu. Zaczyna u nas coraz liczniej zimować. Jako siedliska preferują zbiorniki o dużej toni wodnej. Najczęściej spotykamy je na mocno zarośniętych jeziorach i stawach oraz na wolno płynących rzekach.

II. Charakterystyka ogólna

Jest to nasza największa kaczka nurkująca, ciut mniejsza od krzyżówki, o krępej budowie ciała. Kaczor w szacie godowej ma rdzawo-brązową głowę, czarny ogon i wolę. Reszta ciała jest popielato-szara. Samica jest jednolicie płowobrazowa. Wiosła są stalowego koloru, dziób ciemniejszy wpadający w czerń.

III. Odżywianie

Pokarmem ich są w przeważającej części młode pędy i kłacza, pączki i nasiona roślin wodnych. Zjadają także wszelakie owady, ślimaki i inne mniejsze żyjątka. Za pokarmem nurkują na niewielką głębokość. Zdarza im się także brodzić i zbierać pokarm z powierzchni wody.

IV. Rozmnażanie i rozwój

Sezon lęgowy głowienki jest zmienny i zależy od wahań poziomu wód. Pod miejsce na budowę gniazda preferowane są wyspy lub stały ląd, najważniejsze jest to, aby miały solidną podstawę. Składają od 8 do 10 jaj i wysiadują je przez około 25 dni. Samiec w tym czasie pełni rolę stróża. Młode potrafią już latać nawet po 50 dniach. Po roku lub dwóch przystępują do rozrodu.

V. Słowniczek

Ciąg – przelot ptaków określonymi i powtarzalnymi trasami.

Lusterko – pobłyskujące plamki na skrzydłach kaczek.

Sady – zbieranie się ptaków na jednym akwenu.

Tabun – większa liczba kaczek.

Wiosła – o nogach ptaków posiadających błonę pławną między palcami.

Zierniki – oczy.

Zapady - wieczorne zlatywanie ptaków na odpoczynek.

Pierzenie się – zmiana upierzenia u ptaków.